

Příbalová informace: informace pro pacienta
Sildenafil 100 mg žvýkací tablety
Kamagra Soft

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Kamagra Soft a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamagra Soft užívat
3. Jak se Kamagra Soft užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Kamagra Soft uchovávat
6. Další informace

1. CO JE KAMAGRA SOFT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kamagra Soft (SILDENAFIL) patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Působí tak, že napomáhá roztážení krevních cév v penisu, a tím umožňuje přítok krve do tohoto orgánu, když jste sexuálně vzrušen. Kamagra Soft Vám pomůže dosáhnout erekce, pouze jestliže jste sexuálně drážděn. Neužívejte Kamagra Soft, jestliže nemáte erektilní dysfunkci. Neužívejte Kamagra Soft, jestliže jste žena.

Kamagra Soft je lék pro muže s erektilní dysfunkcí, někdy nazývanou impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KAMAGRA SOFT UŽÍVAT

Neužívejte Kamagra Soft (sildenafil)

- jestliže užíváte léky zvané nitráty, protože taková kombinace může vyvolat potenciálně nebezpečný pokles Vašeho krevního tlaku. Oznamte svému lékaři, jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků, často podávaných k úlevě od příznaků anginy pectoris ("bolestí na hrudi"). Pokud si nejste jistý, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- jestliže užíváte jakékoli léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože tato kombinace může také způsobit nebezpečné snížení Vašeho krevního tlaku.
- jestliže jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na kteroukoli další složku přípravku Kamagra Soft jestliže jste máte vážnou poruchu činnost srdce nebo jater
- jestliže jste nedávno prodělal mrtvici nebo srdeční záchvat, anebo jestliže máte nízký krevní tlak
- jestliže trpíte určitým vzácným vrozeným očním onemocněním (např retinitis. pigmentosa)
- jestliže jste někdy trpěl ztrátou zraku pro neareritickou přední ischemickou neuropatii očního nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION).

Zvláštní opatření při použití přípravku Kamagra Soft je zapotřebí

Oznamte svému lékaři,

- jestliže trpíte srpkovitou chudokrevností (poruchou červených krvinek), leukémií (nádorové onemocnění bílých krvinek) mnohočetným myelomem (nádorovým onemocněním kostní dřeně)
- jestliže trpíte deformacemi penisu nebo Peyronieovou chorobou
- máte-li problémy se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, jestli Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.

- jestliže trpíte žaludečním vředem nebo krvácivým onemocněním (např. hemofilii)
- jestliže zjistíte náhlé zhoršení zraku nebo ztrátu zraku, přestaňte užívat Kamagra Soft a neodkladně se spojte se svým lékařem.

Neužívejte Kamagra Soft společně s jakoukoli jinou léčbou erektilní dysfunkce.

Zvláštní upozornění pro děti a mladistvé

Kamagra Soft se nepodává osobám mladším než 18 let.

Zvláštní upozornění pro pacienty s poruchou ledvin nebo jater

Oznamte svému lékaři, jestliže trpíte poruchou ledvin nebo jater. Lékař možná rozhodne o nižším dávkování přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Své účinky mohou vzájemně ovlivňovat Kamagra Soft a některé jiné léky, zejména léky používané k léčbě bolestí na hrudi. Při náhlé zdravotní příhodě vždy řekněte ošetřujícímu zdravotníkovi, že jste užil Kamagra Soft a kdy. Neužívejte Kamagra Soft spolu s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte Kamagra Soft, jestliže užíváte léčiva zvaná nitráty, protože kombinace sildenafilu s těmito přípravky může vyvolat potenciálně nebezpečný pokles Vašeho krevního tlaku. Vždy oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků, často užívaných k úlevě při angině pectoris ("bolesti na hrudi").

Neužívejte Kamagra Soft, jestliže užíváte kterékoli léčivo, známé jako donor oxidu dusnatého, např. isoamyl-nitrit (poppers), protože tato kombinace může rovněž vyvolat potenciálně nebezpečný pokles Vašeho krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám Váš lékař obvykle nejmenší možnou sílu (25 mg) přípravku Kamagra Soft.

U některých pacientů, užívajících alfa-sympatolytika k léčbě vysokého krevního tlaku anebo problémů s prostatou, se mohou objevit závratě a točení hlavy; to může být způsobeno nízkým krevním tlakem při posazení nebo rychlém povstání. Někteří pacienti tyto příznaky pocítili při užívání přípravku Kamagra Soft spolu s alfa-sympatolytiky. Nejčastěji se to stává do 4 hodin po užití přípravku Kamagra Soft. Abyste snížil pravděpodobnost, že se tyto příznaky objeví, měl byste se pravidelnou každodenní dávkou alfa-sympatolytika léčit již dříve, než začnete užívat Kamagra Soft. Váš lékař pak případně zahájí Vaši léčbu přípravkem Kamagra Soft nižší dávkou (25 mg).

Užívání přípravku Kamagra Soft s jídlem a pitím

Kamagra Soft se může užívat spolu s jídlem anebo samotný. Někdy však Kamagra Soft začne působit později, jestliže jej užijete spolu s těžkým jídlem.

Alkohol může dočasně porušit Vaši schopnost dosáhnout erekce. Aby Vám Váš lék přinesl co největší prospěch, doporučuje se nepít před užitím přípravku Kamagra Soft nadměrná množství alkoholu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Kamagra Soft není určen pro ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kamagra Soft může vyvolat závratě a může porušit vidění. Je třeba, abyste věděl, jak na sildenafil reagujete, dříve než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE KAMAGRA SOFT UŽÍVÁ

Vždy užívejte Kamagra Soft přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 50 mg.

Neužívejte Kamagra Soft častěji než jednou denně.

Kamagra Soft užíjte asi jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletou nechte rozpustit v ústech, může se též rozkousat a žvýkat

Kamagra Soft 100 mg:

Tabletu je možno dělit na stejné čtvrtiny.

Dělení tablet

Položte tabletu na tvrdý, rovný povrch, hlubší dělicí rýhou směrem vzhůru. Zatlačte palcem na střed tablety a tableta se zlomí na stejné čtvrtiny.

Máte-li pocit, že účinek přípravku Kamagra Soft je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Kamagra Soft Vám pouze pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které Kamagra Soft začne účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle to bývá mezi půlhodinou až hodinou. Pokud přípravek Kamagra Soft užíjete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Jestliže Vám Kamagra Soft nepomůže dosáhnout erekci, anebo jestli erekce netrvá dostatečně dlouho pro dokončení sexuálního styku, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste užil více přípravku Kamagra Soft, než jste měl

Může se u Vás objevit více nežádoucích účinků a mohou být silnější. Dávky vyšší než 100 mg nemají vyšší účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám řekl Váš lékař.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užíjete více tablet než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Kamagra Soft nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, ohlášené ve spojitosti s užíváním přípravku Kamagra Soft, bývají obvykle slabé až středně silné a trvají krátce.

Objeví-li se u Vás v průběhu styku anebo po něm bolesti na hrudi:

- Zaujměte polohu v polosedě a snažte se uvolnit.
- **Neužívejte nitráty** k léčbě bolesti na hrudi.
- Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Všechny léky včetně přípravku Kamagra Soft mohou vyvolat alergické reakce. Spojte se se svým lékařem ihned, jakmile by se u Vás po užití přípravku Kamagra Soft objevil kterýkoli z těchto příznaků: náhlá dýchavičnost, dechové obtíže nebo závratě, otoky víček, obličeje, rtů nebo krku.

Po užití přípravku Kamagra Soft byly občas ohlášeny dlouhotrvající nebo bolestivé erekce. Máte-li erekci trvající déle než 4 hodiny, ihned se spojte s lékařem.

Objeví-li se u Vás náhlé zhoršení zraku nebo ztráta zraku, přestaňte Kamagra Soft užívat a neodkladně se spojte se svým lékařem.

Velmi častý nežádoucí účinek (s pravděpodobností výskytu u více než 1 pacienta z 10) je bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (s pravděpodobností výskytu u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou: Zrudnutí obličeje, trávicí obtíže, ovlivnění zraku (změny barevného vidění, světloplachost, rozmazané vidění a snížená zraková ostrost), ucpaný nos a závratě.

Méně časté nežádoucí účinky (s pravděpodobností výskytu u 1 až 10 pacientů z 1000) jsou: zvracení, vyrážka, krvácení očního pozadí, podráždění očí, krví podlité oči/zarudlé oči, bolesti očí, dvojité vidění, nenormální pocity v očích, nepravidelný a rychlý tep, bolesti svalů, ospalost, snížená citlivost na dotyk, závratě, zvonění v uších, nevolnost, sucho v ústech, bolest na hrudi, únava.

Vzácné nežádoucí účinky (s pravděpodobností výskytu u 1 až 10 pacientů z 10000) jsou: vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, omdlévání, mrtvice, krvácení z nosu a prudké zhoršení nebo ztráta sluchu.

Další nežádoucí účinky ohlášené po uvedení přípravku na trh jsou: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlé úmrtí, srdeční záchvat nebo přechodně snížené prokrvení některých částí mozku. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla problémy se srdcem již předtím, než užíli tento přípravek. Není možné zjistit, zdali uvedené příhody měly přímou souvislost s přípravkem Kamagra Soft. Byly hlášeny také případy výskytu křečí nebo záchvatů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK KAMAGRA SOFT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Kamagra Soft nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Kamagra Soft obsahuje

Léčivá látka je sildenafil.

Jedna tableta obsahuje 140,4 mg sildenafili citras, což odpovídá 100 mg sildenafilum