

**Příbalová informace: informace pro pacienta**  
**Lovegra 100 mg potahované tablety**  
**Sildenafil**

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

**V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je Lovegra a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lovegra užívat
3. Jak se Lovegra užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lovegra uchovávat

**1. Co je Lovegra a k čemu se používá**

Přípravek Lovegra je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálnímu vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do vagíny, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek Lovegra Vám pomůže navodit orgasmus pouze tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte sexuálními dysfunkcemi, neměli byste tento lék užívat.

Přípravek Lovegra se používá k léčbě žen se sexuálními dysfunkcemi:

- snížená sexuální touha
- nedostatečné zvlhnutí při sexu
- neschopnost dosáhnout orgasmus

**2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lovegra užívat**

**Neužívejte Lovegra:**

- Pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. Isoamyl-nitrit. Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě angíny pectoris (bolesti na hrudníku). Přípravek Lovegra může závažně zvýšit účinek těchto léků. Pokud takové léky užíváte, vždy to sdělte svému lékaři. Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka
- Pokud jste alergická (přecitlivělá) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku
- Pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater
- Jestliže jste měla nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt
- Pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako je retinitis pigmentosa)
- Máte nízký krevní tlak
- Pokud jste přišli o zrak v důsledku neareritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).
- jestliže užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevního tlaku v plicích sekundárních krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například Lovegra (sildenafil), bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát nebo si nejste jisti, informujte svého lékaře.

Přípravek Lovegra není určen pro muže a ženy mladší 18 let.

**Zvláštní opatření při použití přípravku Lovegra je zapotřebí**

Oznamte svému lékaři,

- jestliže trpíte srpkovitou chudokrevností (poruchou červených krvinek), leukémií (nádorové onemocnění bílých krvinek) mnohočetným myelomem (nádorovým onemocněním kostní dřve)
- máte-li problémy se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, jestli Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.
- jestliže trpíte žaludečním vředem nebo krvácivým onemocněním (např. hemofilii)
- jestliže zjistíte náhlé zhoršení zraku nebo ztrátu zraku, přestaňte užívat Lovegru a neodkladně se spojte se svým lékařem.

Neužívejte přípravek Lovegra současně s léčivými přípravky na plicní arteriální hypertenzi (PAH) obsahujícími sildenafil ani s žádnými jinými inhibitory PDE5.

#### Zvláštní upozornění pro pacientky s poruchou ledvin nebo jater

Oznamte svému lékaři, jestliže trpíte poruchou ledvin nebo jater. Lékař možná rozhodne o nižším dávkování přípravku.

#### **Vzájemné působení s dalšími léky:**

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Lovegra může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčbě bolesti na hrudi. V případě náhlých zdravotních problémů byste měli ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užívala přípravek Lovegra. Neužívejte Lovegra společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Přípravek Lovegra může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty a léků schopných uvolňovat oxid dusnatý jako je např. Isoamyl-nitrit, které jsou často používány při léčbě anginy pectoris (nebo bolesti na hrudi). Pokud užíváte takové léky, nesmíte užívat Lovegra.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám Váš lékař obvykle nejmenší možnou sílu (25 mg) přípravku Lovegra.

U některých pacientek, užívajících alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku se mohou objevit závratě a točení hlavy; to může být způsobeno nízkým krevním tlakem při posazení nebo rychlém povstání. Nejčastěji se to stává do 4 hodin po užití přípravku Lovegra. Abyste snížil pravděpodobnost, že se tyto příznaky objeví, měl byste se pravidelnou každodenní dávkou alfa-blokátoru léčit již dříve, než začnete užívat Lovegra. Váš lékař pak případně zahájí Vaši léčbu přípravkem Lovegra nižší dávkou (25 mg).

#### **Přípravek Lovegra s jídlem, pitím a alkoholem**

Přípravek Lovegra může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však účinek přípravku Lovegra může projevit později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost sexuálního vzrušení. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Lovegra nepožívat větší množství alkoholu.

#### **Těhotenství a kojení**

Neužívejte přípravek Lovegra v době těhotenství a v době kojení.

#### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Lovegra může vyvolat závratě a rozmazané vidění. Je třeba, abyste věděl, jak na přípravek Lovegra (sildenafil) reagujete, dříve než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

#### **Přípravek Lovegra obsahuje laktózu**

Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je např. laktóza, kontaktujte před užitím přípravku Lovegra svého lékaře.

### **3. Jak se Lovegra užívá**

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle instrukcí svého lékaře. Nejste-li si jist správným užíváním, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená zahajovací dávka přípravku Lovegra je 50 mg. **Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Lovegra denně.**

Užijte přípravek Lovegra zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletou spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže cítíte, že přípravek Lovegra účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek Lovegra užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

#### **Jestliže jste užil více přípravku Lovegra, než jste měla**

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet než jste měla.

#### **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím přípravku Lovegra bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

**Pokud se u Vás objevil některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Lovegra užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:**

- Alergická reakce – k té dochází **méně často** (může postihnout až 1 ze 100 pacientek)

Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.

- Bolest na hrudníku – k té dochází **méně často**

Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:

- posad'te se do polosedu a snažte se odpočívat,
- **neužívejte** na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.

- Náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku – k tomu dochází **vzácně**

- Těžké kožní reakce – k těm dochází **vzácně**

Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu a kolem očí, horečku

Křečové stavy nebo záchvaty – k těm dochází **vzácně**

#### **Další nežádoucí účinky:**

**Velmi časté** (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.

**Časté** (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): nevolnost, zarudnutí v obličeji, nával horka (příznaky zahrnují náhlý pocit horka v horní části těla), zažívací potíže, změny barevného vidění, rozmazané vidění, poruchy vidění, ucpaný nos a závrať.

**Méně časté** (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, vidění záblesků světla, zrakový vjem jasu, citlivost na světlo, slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, ucpané vedlejší dutiny nosní, zánět nosní sliznice (příznaky zahrnují rýmu, kýchání a ucpaný nos), bolest horní poloviny břicha, refluxní choroba jícnu (příznaky zahrnují pálení žáhy), přítomnost krve v moči, bolest paží nebo nohou, krvácení z nosu, pocit horka a únava.

**Vzácně** (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku, stažení hrdla, znečitlivěná ústa, krvácení na očním pozadí, dvojité vidění, snížená zraková ostrost, neobvyklý pocit v oku, otok oka nebo očního víčka, malé částice nebo tečky ve vidění, vidění světelných kruhů kolem

světel, rozšíření zornice, změna zabarvení očního bělma, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu, suchost v nose, zduření uvnitř nosu, pocit podrážděnosti a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění srdce) a náhlé smrti. Je třeba poznamenat, že většina pacientek, ale ne všechny, které měly tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím přípravku Lovegra.

#### **5. Jak přípravek Lovegra uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do: /EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.