

**Příbalová informace: informace pro pacienta**  
**Sildenafil 50mg, 100 mg žvýkací tablety**  
**Viagra Soft (generikum)**

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

**V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je Viagra Soft a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Viagra Soft užívat
3. Jak se Viagra Soft užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Viagra Soft uchovávat
6. Další informace

**1. CO JE VIAGRA SOFT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Viagra Soft (SILDENAFIL) patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Působí tak, že napomáhá roztažení krevních cév v penisu, a tím umožňuje přítok krve do tohoto orgánu, když jste sexuálně vzrušen. Viagra Soft Vám pomůže dosáhnout erekce, pouze jestliže jste sexuálně drážděn. Neužívejte Viagra Soft, jestliže nemáte erektilní dysfunkci. Neužívejte Viagra Soft, jestliže jste žena.

Viagra Soft je lék pro muže s erektilní dysfunkcí, někdy nazývanou impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

**2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VIAGRA SOFT UŽÍVAT**

**Neužívejte Viagra Soft (sildenafil)**

- jestliže užíváte léky zvané nitráty, protože taková kombinace může vyvolat potenciálně nebezpečný pokles Vašeho krevního tlaku. Oznamte svému lékaři, jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků, často podávaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (“bolestí na hrudi”). Pokud si nejste jistý, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- jestliže užíváte jakékoli léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože tato kombinace může také způsobit nebezpečné snížení Vašeho krevního tlaku.
- jestliže jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na kteroukoli další složku přípravku Viagra Soft
- jestliže máte vážnou poruchu činnosti srdce nebo jater
- jestliže jste nedávno prodělal mrtvici nebo srdeční záchvat, anebo jestliže máte nízký krevní tlak
- jestliže trpíte určitým vzácným vrozeným očním onemocněním (např. retinitis pigmentosa)
- jestliže jste někdy trpěl ztrátou zraku pro neareritickou přední ischemickou neuropatii očního nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION).

**Zvláštní opatření při použití přípravku Viagra Soft je zapotřebí**

Oznamte svému lékaři,

- jestliže trpíte srpkovitou chudokrevností (poruchou červených krvinek), leukémií (nádorové onemocnění bílých krvinek) mnohočetným myelomem (nádorovým onemocněním kostní dřeně)
- jestliže trpíte deformacemi penisu nebo Peyronieovou chorobou

- máte-li problémy se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, jestli Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.
- jestliže trpíte žaludečním vředem nebo krvácivým onemocněním (např. hemofilií)
- jestliže zjistíte náhlé zhoršení zraku nebo ztrátu zraku, přestaňte užívat Viagra Soft a neodkladně se spojte se svým lékařem.

Neužívejte Viagra Soft společně s jakoukoli jinou léčbou erektilní dysfunkce.

#### Zvláštní upozornění pro děti a mladistvé

Viagra Soft se nepodává osobám mladším než 18 let.

#### Zvláštní upozornění pro pacienty s poruchou ledvin nebo jater

Oznamte svému lékaři, jestliže trpíte poruchou ledvin nebo jater. Lékař možná rozhodne o nižším dávkování přípravku.

#### **Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky**

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Své účinky mohou vzájemně ovlivňovat Viagra Soft a některé jiné léky, zejména léky používané k léčbě bolestí na hrudi. Při náhlé zdravotní příhodě vždy řekněte ošetřujícímu zdravotníkovi, že jste užil Viagra Soft a kdy. Neužívejte Viagra Soft spolu s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte Viagra Soft, jestliže užíváte léčiva zvaná nitráty, protože kombinace sildenafilu s těmito přípravky může vyvolat potenciálně nebezpečný pokles Vašeho krevního tlaku. Vždy oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže užíváte kterýkoli z těchto léků, často užívaných k úlevě při angině pectoris ("bolesti na hrudi").

Neužívejte Viagra Soft, jetliže užíváte kterékoli léčivo, známé jako donor oxidu dusnatého, např. isoamyl-nitrit (poppers), protože tato kombinace může rovněž vyvolat potenciálně nebezpečný pokles Vašeho krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám Váš lékař obvykle nejmenší možnou sílu (25 mg) přípravku Viagra Soft.

U některých pacientů, užívajících alfa-sympatolytika k léčbě vysokého krevního tlaku anebo problémů s prostatou, se mohou objevit závratě a točení hlavy; to může být způsobeno nízkým krevním tlakem při posazení nebo rychlém povstání. Někteří pacienti tyto příznaky pocítili při užívání přípravku Viagra Soft spolu s alfa-sympatolytiky. Nejčastěji se to stává do 4 hodin po užití přípravku Viagra Soft. Abyste snížil pravděpodobnost, že se tyto příznaky objeví, měl byste se pravidelnou každodenní dávkou alfa-sympatolytika léčit již dříve, než začnete užívat Viagra Soft. Váš lékař pak případně zahájí Vaši léčbu přípravkem Viagra Soft nižší dávkou (25 mg).

#### **Užívání přípravku Viagra Soft s jídlem a pitím**

Viagra Soft se může užívat spolu s jídlem anebo nalačno. Někdy však Viagra Soft začne působit později, jestliže jej užijete spolu s těžkým jídlem.

Alkohol může dočasně porušit Vaši schopnost dosáhnout erekce. Aby Vám Váš lék přinesl co největší prospěch, doporučuje se nepít před užitím přípravku Viagra Soft nadměrná množství alkoholu.

#### **Těhotenství a kojení**

Přípravek Viagra Soft není určen pro ženy.

#### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Viagra Soft může vyvolat závratě a může porušit vidění. Je třeba, abyste věděl, jak na Viagra Soft reagujete, dříve než začnete řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

### 3. JAK SE VIAGRA SOFT UŽÍVÁ

Vždy užívejte Viagra Soft přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 50 mg.

*Neužívejte Viagra Soft častěji než jednou denně.*

Viagra Soft užíjte asi jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu nechte rozpustit v ústech, může se též rozkousat a žvýkat

*Viagra Soft 50 mg:*

Tabletu je možno dělit na stejné čtvrtiny. Je nutno užít nejméně 2 čtvrtiny (odpovídající 25 mg) tablety k dosažení minimálního efektu.

*Viagra Soft 100 mg:*

Tabletu je možno dělit na stejné čtvrtiny.

#### Dělení tablet

Položte tabletu na tvrdý, rovný povrch, hlubší dělicí rýhou směrem vzhůru. Zatlačte palcem na střed tablety a tableta se zlomí na stejné čtvrtiny.

Máte-li pocit, že účinek přípravku Viagra Soft je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Viagra Soft Vám pouze pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které Viagra Soft začne účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle to bývá mezi půlhodinou až hodinou. Pokud přípravek Viagra Soft užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Jestliže Vám Viagra Soft nepomůže dosáhnout erekci, nebo jestli erekce netrvá dostatečně dlouho pro dokončení sexuálního styku, řekněte to svému lékaři.

#### **Jestliže jste užil více přípravku Viagra Soft, než jste měl**

Může se u Vás objevit více nežádoucích účinků a mohou být silnější. Dávky vyšší než 100 mg nemají vyšší účinnost.

*Neužívejte více tablet, než Vám řekl Váš lékař.*

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Viagra Soft nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, ohlášené ve spojitosti s užíváním přípravku Viagra Soft, bývají obvykle slabé až středně silné a trvají krátce.

Objeví-li se u Vás v průběhu styku anebo po něm bolesti na hrudi:

- Zaujměte polohu v polosedě a snažte se uvolnit.
- **Neužívejte nitráty** k léčbě bolesti na hrudi.
- Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Všechny léky včetně přípravku Viagra Soft mohou vyvolat alergické reakce. Spojte se se svým lékařem ihned, jakmile by se u Vás po užití přípravku Viagra Soft objevil kterýkoli z těchto příznaků: náhlá dýchavičnost, dechové obtíže nebo závratě, otoky víček, obličeje, rtů nebo krku.

Po užití přípravku Viagra Soft byly občas ohlášeny dlouhotrvající nebo bolestivé erekce. Máte-li erekci trvající déle než 4 hodiny, ihned se spojte s lékařem.

Objeví-li se u Vás náhlé zhoršení zraku nebo ztráta zraku, přestaňte Viagra Soft užívat a neodkladně se spojte se svým lékařem.

**Velmi častý nežádoucí účinek** (s pravděpodobností výskytu u více než 1 pacienta z 10) je bolest hlavy.

**Časté nežádoucí účinky** (s pravděpodobností výskytu u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou: Zrudnutí obličeje, trávící obtíže, ovlivnění zraku (změny barevného vidění, světloplachost, rozmazané vidění a snížená zraková ostrost), ucpaný nos a závratě.

**Méně časté nežádoucí účinky** (s pravděpodobností výskytu u 1 až 10 pacientů z 1000) jsou: zvracení, vyrážka, krvácení očního pozadí, podráždění očí, krví podlité oči/zarudlé oči, bolesti očí, dvojité vidění, nenormální pocity v očích, nepravidelný a rychlý tep, bolesti svalů, ospalost, snížená citlivost na dotyk, závratě, zvonění v uších, nevolnost, sucho v ústech, bolest na hrudi, únava.

**Vzácné nežádoucí účinky** (s pravděpodobností výskytu u 1 až 10 pacientů z 10000) jsou: vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, omdlávání, mrtvice, krvácení z nosu a prudké zhoršení nebo ztráta sluchu.

Další nežádoucí účinky ohlášené po uvedení přípravku na trh jsou: bušení srdce, bolest na hrudi, náhlé úmrtí, srdeční záchvat nebo přechodně snížené prokrvení některých částí mozku. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla problémy se srdcem již předtím, než užili tento přípravek. Není možné zjistit, zdali uvedené příhody měly přímou souvislost s přípravkem **Viagra Soft**. Byly hlášeny také případy výskytu křečí nebo záchvatů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

## 5. JAK VIAGRA SOFT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Viagra Soft nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## 6. DALŠÍ INFORMACE

### Co Viagra Soft obsahuje

Léčivá látka je sildenafil.

Jedna tableta obsahuje 70,2/140,4 mg sildenafili citras, což odpovídá 50 mg/100 mg sildenafilum